

E dopo un pranzo luculliano"i arriva la dispepsia

Alito cattivo? Nausea? Precoce pienezza gastrica? Acidità e reflusso gastroesofageo? Ecco i sintomi della dispepsia, patologia molto frequente (ne soffrono circa il 40% delle persone in forma cronica) che interessa la funzionalità digestiva e colpisce l'epigastrio, il tratto superiore e centrale dell'addome. La fascia di età prevalentemente coinvolta è quella tra i 40 e 50 anni, ma sono in aumento le dispepsie "giovani". A seconda delle cause, la dispepsia viene distinta in organica, funzionale e isterica. È considerata organica quando è causata da farmaci (antinfiammatori non steroidei, i cosiddetti fans, corticosteroidi e alcuni antibiotici), oppure quando è correlata alla presenza di patologie del tratto digestivo superiore (ulcera peptica, neoplasie dell'esofago o dello stomaco, calcolosi biliare) o a patologie sistemiche (patologie delle ghiandole endocrine, insufficienza cardiaca, insufficienza renale), o a patologie occlusive a livello linfatico o venoso, oppure a patologie autoimmuni (malattie che determinano risposte anomale del sistema immunitario, originando un'alterazione funzionale

...

Consultazione dell'intero articolo riservata agli abbonati

01/10/2015